



ISTITUTO
CLINICO
SANT'AMBROGIO

Via Faravelli, 16 – 20149 Milano – Tel. 02.33127.1 –

Servizio di Diagnostica per Immagini

PREPARAZIONE PER ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE, INFERIORE E COMPLETO

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE:

- Mantenere il digiuno nelle 5 ore precedenti l'esame;
- Assumere Simeicone 40 mg. (dimetilpolisilossano attivato) 4 cp/die (specificatamente 2 cp alla fine del pranzo e 2 cp alla fine della cena) nei tre giorni precedenti l'esame.

ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE:

- 2 ore prima dell'esame : svuotare la vescica, trattenere le urine e bere almeno 1 litro d'acqua;
- Assumere Simeicone 40 mg (dimetilpolisilossano attivato) 4 cp/die (specificatamente 2 cp alla fine del pranzo e 2 cp alla fine della cena) nei tre giorni precedenti l'esame.

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO:

- Mantenere il digiuno nelle 5 ore precedenti l'esame;
- 2 ore prima dell'esame : svuotare la vescica, trattenere le urine e bere almeno 1 litro d'acqua;
- Assumere Simeicone 40 mg (dimetilpolisilossano attivato) 4 cp/die (specificatamente 2 cp alla fine del pranzo e 2 cp alla fine della cena) nei tre giorni precedenti l'esame.

N.B. La paziente gravida NON deve assumere Simeicone 40 mg

Lattanti e bambini: l'assunzione del Simeicone 40 mg è a discrezione dello Specialista

Pediatra

Si prega di:

- portare la documentazione in proprio possesso (ecografie, radiografia, cartelle cliniche, ecc.)
- telefonare alla segreteria TAC (n. tel. 02/33127043) in caso di rinuncia all'esecuzione dell'esame.