

结肠镜检查

什么“

结肠镜检查是一种诊断测试，让医生看到里面的大肠（结肠）。

随着内窥镜，长期用相机或在镜片（光纤）和自己最灵活的光管，你爬上通过肛门和探索整个大肠。

如何发生

考试通常持续15-30分钟，在温和的疼痛，通常的结果，主要涉及到的空气通过内镜放置，以舒展的肠道壁，以探索更多。

考试可能不太容忍在很长的肠子的情况下，或在腹部手术后粘连的存在。出于这个原因，在考试之前和期间，您将得到的镇静剂或止痛药，以帮助您更好地配合小剂量的过程。检查前，医生应报告任何过敏药物，或药物治疗到位。

考试期间，重要的是放宽尽可能多的腹部肌肉，这将有利于仪器的发展，使这个过程短。

一般不超过半小时后，考试结束，您将可以从医院离开，但药物的镇静作用，即使轻微的，不允许机动车辆至少8小时的车程结束后检查。

为什么是由

通过结肠镜，其中有一个直径约等于你的食指，展望，医生有一个清晰，明确你的肠道，并能识别或排除疾病。

它是有用的定义通常与结肠，乙状结肠和直肠疾病相关症状的原因。因此，建议在出现腹痛，便秘或腹泻的存在，或者最近出现的突出，往往不是解决。

它也是有用的，确定的便血或某些贫血（低红细胞）的存在原因。

有时医生可能会认为适当的退出，在检查，组织小片段（活检），然后再发送到微观分析实验室。

这种方法是在感染肠道疾病和炎症，而不一定只有在有癌症的怀疑很多情况下非常有用。

这些碎片是完全无痛去除，并通过小镊子使用做的事是通过探头本身的介绍。一个结肠镜检查也允许某些疾病，如肠息肉，其中以前需要一个真正的手术治疗。

息肉是rilevatezze肠道黏膜，大部分都是良性的，并不少见50岁以后，可以在结肠镜检查删除。

为此，它使用一种特殊的电针形环，这在完全无痛的，通过燃烧消除了息肉基地。部分或全部息肉碎片，然后收回作病理检查。

有哪些并发症

一个结肠镜检查是一种安全的手术。虽然现代设备将使超过90%的病例为肠道全面研究，有时在一个漫长而复杂，特别是肠道粘连现象或存在，可能会出现的问题，整个结肠的探索。严重并发症的发生率是非常罕见的，主要用于调车作业（如息肉去除）有关。而“但只是了解有关的风险，虽然遥控器，你可就惨了。

（：;结肠镜活检后0.09%：0.7%后，诊断结肠镜检查）穿孔：0.1%，出血：0.48%0.5%：（出血，穿孔等）总严重并发症。

只有偶尔在考试后，有可能是发炎或肿胀的静脉的手臂，那里的镇静剂注射，从而解决自发地或与消炎药膏在几天的帮助。其他的老年患者，或有严重的呼吸或心脏疾病镇静剂使用中产生的潜在风险。只有在特殊情况下，如果活检进行，可以有出血，通常本身停止。

准备考试的秘诀

结肠镜检查前应充分准备，因为肠道可以评估只有在粪便的情况下准确。出于这个原因，门诊内镜，因诺琴蒂基金会Clinic o Sant'Ambrogio将提供有关通便药物使用和饮食建议类型满意的答复。

重要的是要遵循将用于肠道清洁的指示。