

胃鏡 - SETS

在您閱讀本指南請交付人員的小冊子。謝謝您的合作 -

什麼是... ..在胃鏡是一個過程，允許醫生在進行內部檢查，直視你的食道，胃和十二指腸，檢測疾病。

為此，您使用探頭，胃鏡厘米，直徑約一個鏡頭或提示（光纖）和光一角，輕輕地介紹這是通過口或鼻子，直到達到十二指腸。

如何執行 ...

...考試不提供痛苦的，但只有輕微的不適，以引進的儀器。出於這個原因有可能是小劑量的麻醉劑噴局部麻醉的喉嚨和鼻子的情況下反式鼻內窺鏡。

考試前還要向你的醫生任何過敏藥物，或藥物治療的地方。

考試期間，持續時間通常較短，重要的是要保持輕鬆的姿勢，呼吸緩慢而深入，這將有助於控制任何感覺不適，並更好地容忍了考試，並允許醫生導致完成此過程更加迅速。

幾分鐘後，最終的考試，您將能夠得到遠離醫院，但鎮靜作用的藥物，雖然平淡無奇，不允許開車約三小時後結束考試。

你可以把食物和飲料將會消失後，影響局部麻醉的喉嚨。

為什麼是由... ..看，通過胃鏡，醫生有一個明確的目標和精確的你的器官，並能識別或排除疾病。

它是非常有用的定義的原因，症狀通常與疾病的食管，胃和十二指腸。因此，建議醫生當有症狀，如疼痛，噁心，嘔吐和消化困難，持續時間長。它也是有用的發現引起出血在上消化道，或某些貧血（低紅細胞）。

在胃鏡提供更精確的信息可能比你用X -

射線的消化系統。能夠執行活檢（去除小片段黏膜），當醫生認為它很有用，進一步提高了診斷能力的考試。

活檢是完全無痛和執行原因是多方面的（例如，要搜索一種病菌，通常伴有潰瘍和胃炎），而不一定只有在有懷疑的癌症。

有哪些並發症在胃鏡的過程很安全。

只有偶爾在考試後，有可能是發炎或腫脹的靜脈的手臂，那裡的鎮靜劑注射，從而解決自發地或與幫助消炎藥膏在幾天之內。

其他潛在的風險所產生的使用鎮靜劑老年患者，或有嚴重的呼吸或心臟疾病。

只有在特殊情況下，如果活檢進行，可以有出血，這通常會停止油然而生。

其發病的主要並發症，穿孔是非常低（小於1萬），而往往是聯繫在一起的存在嚴重的食道疾病。

考試準備的提示... ..在胃鏡，需要禁食至少6 /

8小時，因此，如果考試是在上午進行，建議由前一天晚上禁食，同時，當它被安排在下午，允許清淡的早餐在上午。

檢查前你應該刪除任何假牙家具。

如果你經常吃藥，他們通常還繼續在當天的前2-

3小時。它應該，但是，避免採取解決方案（抗酸劑，硫糖鋁），這可能使其難以執行檢查，妨礙視野。